

ZIKA






ປ້ອງກັນຕົວເອງເພື່ອປ້ອງກັນຄົນອື່ນ

ສາມາດຖືກແຜ່ກະຈາຍໄດ້ແນວໃດ



ຊີກາແມ່ນພະຍາດໄວລັສທີ່ແຜ່ກະຈາຍຈາກຍຸງຫຼືຄົນໄດ້






ຈາກຍຸງສູ່ຄົນ:



ຈາກຄົນສູ່ຍຸງ:



ຈາກຄົນສູ່ຄົນ:



ອາການພົບພໍ້ຫລາຍມີຫຍັງແດ່



ມີໄຂ້



ຜົນຄັນ



ເມື່ອຍຂໍ້ຕໍ່



ຕາແດງ

ເຈົ້າອາດມີອາການເຫລົ່ານີ້ບໍ່ດົນປານໃດ, ຫຼືບາງຄົນທີ່ຕິດຊີກາອາດບໍ່ສະແດງອາການອັນໃດເລີຍກໍໄດ້.

ໃຫ້ເຈົ້າປຶກສາຫາລືກັບທ່ານໝໍກ່ຽວກັບການກວດຊີກາຖ້າຫາກ:

- ◆ ເຈົ້າມີອາການຊີກາ ຫຼື ເຈົ້າຖືພາແລະເຈົ້າຫຼືຄູ່ຂອງ/
- ◆ ເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງໄປບ່ອນທີ່ມີຊີກາ




ຖ້າຫາກເຈົ້າຕິດຊີກາຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ

ຊີກາບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບກັບທຸກຄົນ. ແຕ່ສໍາລັບບາງຄົນ, ຜົນສາມາດຮ້າຍແຮງຫລາຍທີ່ສຸດ.

ທາລຶກທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກີດ

ທາລຶກສາມາດຕິດເຊື້ອຊີກາກ່ອນເກີດໄດ້. ທາລຶກທີ່ຕິດຊີກາອາດເປັນພະຍາດຫົວເລັກໄດ້, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຫົວແລະສະໝອງຂອງທາລຶກຈະເລັກເກີນຄາດ. ຊີກາສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ການໄດ້ຍິນ, ສະໝອງ, ແລະການເຕີບໃຫຍ່ຂອງທາລຶກໄດ້.



ຜູ້ໃຫຍ່

ເມື່ອຜູ້ໃຫຍ່ຕິດຊີກາ, ມີໂອກາດທີ່ເສັ້ນປະສາດອາດເສຍຫາຍໄດ້, ຊຶ່ງອາດມີຜົນເຮັດໃຫ້ກ້າມຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ ຫຼື ເຫນັບຊາ. ແລ້ວຊີກາຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນອໍາມະພາດໄດ້, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວບາງສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ.



TRANSLATED BY: ASIAN TRANSLATION SERVICE

ຖ້າເຈົ້າຕິດຊີກາ

ສາມາດປິ່ນປົວ ຫຼື ຮັກສາໃຫ້ຫາຍຈາກ ຊີກາ ໄດ້.

ເດັກອາຍຸຕໍ່ກວ່າ 18 ປີຄວນໄປຫາທ່ານໝໍ.

ຖ້າຫາກເຈົ້າແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຕິດຊີກາ ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນໄດ້ໂດຍ:

ພັກຜ່ອນຫລາຍ



ກິນນ້ຳຫລາຍ



ກິນຢາ (ຢາ acetamenophen) ຖ້າຫາກມີໄຂ້ ຫຼື ເມືອຍ



ປ້ອງກັນໄດ້ແນວໃດ

ປັດຈຸບັນນີ້ **ບໍ່ມີຢາວັກຊີນ** ເພື່ອປ້ອງກັນຊີກາ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນຊີກາແມ່ນການປ້ອງກັນຕົນເອງແລະຄົນອື່ນ. ຂັ້ນຕອນທີ່ເຈົ້າເຮັດໄດ້ຮວມເຖິງ:

ໃຊ້ຢາກັນຍຸງທີມີ DEET

ໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວແລະ ໃສ່ຊາຍາວ



◆ ຫລີກເວັ້ນຈາກການເດີນທາງໄປບ່ອນຕ່າງ ທີ່ມີຊີກາ

☑ <http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-information>

◆ ຫລີກເວັ້ນຈາກການແຜ່ກະຈາຍຊີກາຜ່ານເພດສຳພັນ

☑ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຫຼື

☑ ລໍຖ້າໃຫ້ມີເພດສຳພັນຫຼັງຈາກເດີນທາງໄປບ່ອນທີ່ມີຊີກາ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າບໍ່ມີອາການຊີກາກໍຕາມ


- ແມ່ຍິງ - ໃຫ້ລໍ 8 ອາທິດຫຼັງອອກຈາກພື້ນທີ່ຊີກາ

- ຜູ້ຊາຍ - ໃຫ້ລໍ 6 ເດືອນຫຼັງອອກຈາກພື້ນທີ່ຊີກາ




◆ ຢ່າໃຫ້ຍຸງເຂົ້າມາໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າ. ຂໍຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມອີກຈາກທ່ານໝໍຂອງເຈົ້າໄດ້.


ປິດປະຕູແລະໜ້າຕ່າງ



ໃຊ້ມຸງລວດເມື່ອເປີດປະຕູແລະໜ້າຕ່າງ



ຮັກສາສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ທີ່ອາດເກັບນ້ຳ (ເຊັ່ນ ກະຖາງຕົ້ນໄມ້ແລະຢາງລົດເກົາ) ໃຫ້ແຫ້ງແລະສະອາດ



ຈື່ຈຳໄວ້ວ່າ

ເຈົ້າອາດຕິດຊີກາໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວໄດ້. ປ້ອງກັນຕົວເອງເພື່ອປ້ອງກັນຄົນອື່ນ. ປົກສາຫາລືທ່ານພໍ້ຖ້າຫາກເຈົ້າມີຂໍສົງໄສ.